






## Ceftazidime

### Solutions

Sodium bicarbonate 5%	
Dextrose 5 & 10%	
Dextrose 5% in sodium chloride 0.2, 0.45 & 0.9%	
Ringer's injection, lactated	
Sodium chloride 0.9%	

### การละลายและการเจือจาง

ละลายผงยาด้วย SWFI 10 ml และเจือจางต่อด้วยตัวทำละลาย 50-100 ml

### ความคงตัวหลังผสม

1. เมื่อละลายยาด้วย Sterile water for injection ให้ใช้ภายใน 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง, หากเก็บในตู้เย็น ให้ใช้ภายใน 7 วัน
2. เมื่อเจือจางให้ใช้ภายใน 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง, หากเก็บในตู้เย็น ให้ใช้ภายใน 7 วัน
3. สีของสารละลายอาจเข้มขึ้นระหว่างการเก็บรักษา (เหลืองอ่อน → สีน้ำตาลเหลือง) แต่ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของยา

### ข้อควรระวัง

ระวังพิษต่อระบบประสาทหากให้ในผู้ป่วยโรคไต