




## Ceftriaxone

### Solutions

Dextrose 5 &10%	
Sodium chloride 0.9%	
Calcium gluconate	

### การละลายและการเจือจาง

ละลายผงยาด้วย SWFI 10 ml สำหรับผงยา 1g และ 19.2 ml สำหรับผงยา 2 g และเจือจางต่อด้วยตัวทำละลายให้ได้ความเข้มข้นสุดท้าย 10-40 mg/ml

หากให้ทาง IM ให้ผสม lidocaine 1% 2 ml

### ความคงตัวหลังผสม

1. เมื่อละลายยาด้วย Sterile water for injection ให้ใช้ภายใน 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง, เก็บในตู้เย็นให้ใช้ภายใน 7 วัน
2. เมื่อเจือจางให้ใช้ภายใน 2 วันที่อุณหภูมิห้อง, เก็บในตู้เย็นให้ใช้ภายใน 7 วัน

### ข้อควรระวัง

1. Ceftriaxone solution ที่มี Lidocaine ห้ามให้ทาง IV
2. ห้ามใช้ใน Full-term neonates (อายุ 28 วัน) เพราะอาจเกิดดีซ่าน

ห้ามการให้ยานี้ร่วมกับ Calcium containing products