


การส่องกล้องตรวจปากมดลูก

COLPOSCOPY



การตรวจหาความผิดปกติของปากมดลูกและช่องคลอด ผ่านการส่องกล้อง colposcope ซึ่งการมองผ่านกล้องและชโลมสารละลายกรด acetic ทำให้สามารถมองเห็นรอยโรคชัดเจนขึ้น หัตถการที่อาจทำร่วมกับการตรวจคือการตัดชิ้นเนื้อที่สงสัยความผิดปกติส่งตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อการวินิจฉัยต่อไป

การเตรียมตัวก่อนส่องกล้องตรวจปากมดลูก

- งดการมีเพศสัมพันธ์ การสวนล้าง และการสอดยาทางช่องคลอดก่อนการตรวจอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- ไม่จำเป็นต้องงดน้ำ หรืออาหารก่อนการตรวจ
- ควรเตรียมผ้าอนามัยเพื่อใส่หลังตรวจ เพราะการตรวจและขลิบตัดชิ้นเนื้ออาจทำให้มีเลือดออกเล็กน้อย
- ถ้าคาดว่าจะมีประจำเดือนในช่วงวันตรวจควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อทำการนัดตรวจครั้งต่อไป เนื่องจากเลือดประจำเดือนอาจบดบังการส่องกล้องได้
- ถ้าตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ หรือประจำเดือนขาดควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บชิ้นเนื้อบางชนิด

ข้อบ่งชี้ในการทำ Colposcopy

การตรวจด้วยกล้องคอลโปสโคป ทำในกรณีที่ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพบเซลล์ผิดปกติ มีการติดเชื้อไวรัสก่อมะเร็งปากมดลูกชนิดเสี่ยงสูง High-risk HPV หรือ อาการที่น่าสงสัยเป็นมะเร็งปากมดลูก



ขั้นตอนการทำการส่องกล้องตรวจปากมดลูก

- คนไข้ขึ้นเตียงตรวจที่มีขาหยั่งและจัดท่าเหมือนตรวจภายในทั่วไป
- ใส่เครื่องมือขยายช่องคลอด (Speculum)
- ทำการขยสารคัดหลั่งที่ปากมดลูกและชโลมน้ำยา Acetic acid โดยคนไข้จะรู้สึกแสบเล็กน้อย และใช้กล้องตรวจดูเนื้อเยื่อ
- อาจมีการขลิบเนื้อปากมดลูกบางส่วนเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา (บางรายอาจมีการขูดชิ้นเนื้อคอปากมดลูกส่วนในได้)
- แพทย์จะใส่ผ้าก๊อชที่มีสายผูกไว้ในช่องคลอดเพื่อห้ามเลือด
- ถอดเครื่องมือและแจ้งคนไข้ลงจากเตียงขาหยั่ง

การปฏิบัติตัวหลังส่องกล้องปากมดลูก

- นำก๊อชออกจากช่องคลอดเมื่อถึงเวลาที่กำหนด หากนำออกเองไม่สำเร็จ ให้มารพ.
- หากมีการตัดชิ้นเนื้อแนะนำงดการมีเพศสัมพันธ์ 1-2 อาทิตย์ และไม่จำเป็นต้องสวนล้างช่องคลอด
- สามารถรับประทานอาหารหลังทำได้ทันที และทำงานหรือออกกำลังกายได้ตามปกติ
- หากมีเลือดออกผิดปกติ ตกขาวผิดปกติ หรือปวดท้องน้อยมากให้มาพบแพทย์ก่อนนัด
- มาพบแพทย์ตามนัดหมายเพื่อฟังผลชิ้นเนื้อ(ประมาณ 2 อาทิตย์) หรือเพื่อตรวจติดตามหลังการทำการหัตถการ

