

# + Chloral Hydrate syrup 100 mg/ml

## ข้อบ่งใช้และขนาดการใช้

- ◆ **ช่วยทำใหนอนหลับ (Insomnia)**  
ผู้ใหญ่ : รับประทาน 500 mg(5 ml) to 1 g (10 ml) 15-30 นาที ก่อนการทำการหัตถการเด็ก : รับประทาน 50 mg/kg/day (max dose: 1 g/dose)
- ◆ **ช่วยทำให้สงบระงับ (Sedation)**  
ผู้ใหญ่ : รับประทาน 250 mg (2.5 ml) วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร  
เด็ก : รับประทาน 25 mg/kg/day อาจแบ่งให้วันละ 2-3 ครั้งได้

## การผสมยาและความคงตัวของยา

- ◆ รูปแบบยา syrup พร้อม รับประทาน
- ◆ เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 องศา

## การบริหารยา

### แนวทางปฏิบัติก่อนให้ยา

- ◆ ชักประวัติการได้ยาที่ทำให้นอนหลับก่อนหน้านี้ เพื่อป้องกันการเสริมฤทธิ์กันของยา
- ◆ หลีกเลี่ยงการให้ยาในผู้ป่วยที่มีข้อห้าม เช่น ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยโรคหัวใจรุนแรง
- ◆ อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับยาที่เกี่ยวข้องกับข้อบ่งชี้ในการให้ยา ผลข้างเคียงของยา และ ขอความยินยอมในการให้ยารักษา
- ◆ ประเมินอาการก่อนให้ยา กรณีผู้ป่วยทารกแรกเกิด หรือ ผู้ป่วยที่มี severe systemic illness

## อาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญ

- ◆ Respiratory depression
- ◆ Hypotension
- ◆ Hypothermia
- ◆ Cardiac arrhythmias
- ◆ coma

## การติดตามผลการให้ยา

- ◆ ติดตามผู้ป่วยที่ได้รับยาอย่างใกล้ชิด ก่อน และ หลัง การให้ยา
- ◆ ควรเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตไว้บริเวณ ใกล้เตียง
- ◆ ติดตาม vital sign ทุก 15 นาที 2 ครั้ง และทุก 1 ชม. หลังให้ยา
- ◆ Continuous monitor oxygen saturation ใน 1 ชม. แรกหลังให้ยา

## การแก้ไขเมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา

- ◆ หยุดยา และ รายงานแพทย์
- ◆ รักษาและบรรเทาอาการ ตามอาการที่เกิดขึ้น

## รูปแบบ / ความแรงของยาที่มีในโรงพยาบาล



Chloral Hydrate syrup 100 mg/ml