





Acyclovir

Solutions

Dextrose 5%	
Dextrose 5% in sodium chloride 0.2, 0.45, 0.9%	
Ringer's injection, lactated	
Sodium chloride 0.9%	

การละลายและการเจือจาง

ละลายผงยาด้วย SWFI 10 ml และเจือจางต่อด้วย NSS 100 ml

ความคงตัวหลังผสม

1. เมื่อละลายยาด้วย Sterile water for injection ให้ใช้ภายใน 12 ชั่วโมงหลังผสม
2. เมื่อเจือจาง ให้ใช้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังผสม
3. การนำสารละลายยาไปแช่ตู้เย็น อาจเกิดตะกอนขึ้น แต่เมื่อนำมาตั้งที่อุณหภูมิห้องตะกอนจะสามารถละลายไปได้เอง

ข้อควรระวัง

1. ต้องบริหารยาแบบ IV infusion อย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการที่ยาจะไปทำลายไต
2. ต้องให้สารน้ำอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการตกตะกอนของยาในท่อไต

ความเข้มข้นสูงสุด 7 mg/ml เพื่อป้องกันการเกิด phlebitis