






## Cefotaxime

### Solutions

Sodium bicarbonate 7.5%	
Dextrose 5 & 10%	
Dextrose 5% in sodium chloride 0.2, 0.45 & 0.9%	
Ringer's injection, lactated	
Sodium chloride 0.9%	

### การละลายและการเจือจาง

ละลายผงยาด้วย SWFI 4 ml และเจือจางต่อด้วยตัวทำละลาย 40-100 ml

### ความคงตัวหลังผสม

1. เก็บป้องกันจากแสง
2. สีของสารละลายมีตั้งแต่เหลืองอ่อนไปจนถึงน้ำตาลเหลือง การเปลี่ยนสีอาจบ่งชี้ถึงการสูญเสียประสิทธิภาพของยา
3. เมื่อละลายยาด้วย Sterile water for injection ให้ใช้ภายใน 12 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง, หากเก็บในตู้เย็น ให้ใช้ภายใน 24 ชั่วโมง
4. เมื่อเจือจางด้วย Dextrose 5% หรือ Sodium chloride 0.9% ให้ใช้ภายใน 12 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง หากเก็บในตู้เย็น ให้ใช้ภายใน 24 ชั่วโมง