




Streptomycin

Solutions

Sodium chloride 0.9%	
D5w (dextrose 5% in water)	
Sterile water for injection	

การละลายและการเจือจาง

ละลายผงยาด้วย SWFI 1.8 ml จะได้ความเข้มข้น 400 mg/ml

ละลายผงยาด้วย SWFI 3.2 ml จะได้ความเข้มข้น 250 mg/ml

ละลายผงยาด้วย SWFI 4.2 ml จะได้ความเข้มข้น 200 mg/ml

สามารถเจือจางต่อด้วยตัวทำละลายให้ได้ความเข้มข้นสุดท้าย 5-10 mg/ml

ความคงตัวหลังผสม

1. เมื่อผสมยากับสารละลายที่สามารถเข้ากันได้ ควรใช้ให้หมดภายใน 14 วัน ถ้าเก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส และ 24 ชั่วโมง ถ้าเก็บในอุณหภูมิห้อง
2. เก็บให้พ้นจากแสง
3. สารละลายอาจเปลี่ยนสีเมื่อทิ้งไว้นาน แต่ยังสามารถใช้ยาได้

ข้อควรระวัง

1. บริหารยาโดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อเนื้อลึกๆ บริเวณกล้ามเนื้อมัดใหญ่
2. หากให้ IV ให้ infuse นาน 30-60 นาที ห้ามให้ IV push

